

COMMUNICATIONS.

LES DUBLAS DE BULSAR,
ESQUISSE ANTHROPOLOGIQUE,

PAR E.-T. HAMY.

Le nom de Dublas, dérivé de *Durbalas* qui signifie *faibles*, sert à désigner d'une manière générale, dans la présidence de Bombay et plus particulièrement à Surate, les aborigènes de coloration très foncée que l'on comprend avec les Bhils, les Naïkas, les Dhoudias, etc., sous la désignation commune de *Kaliparaj* (*racés noirs*).

Il existait, lors du dernier recensement, 71,533 Dublas dans le seul district de Surate, et dans la subdivision de Bulsar, où ont été recueillies les pièces dont il sera question plus loin, on en comptait 7,726⁽¹⁾. Ce sont, pour la plupart, des agriculteurs, qui peuvent parfois atteindre un certain degré d'aisance, mais vivent le plus souvent d'une manière assez misérable dans des huttes de roseaux. On les dit laborieux mais malpropres, honnêtes mais ivrognes, violents mais hospitaliers.

M. Cumine a consacré à ces indigènes un court article dans le *Gazetteer* de Bombay⁽²⁾, mais il ne donne aucun renseignement sur leurs caractères physiques.

Il n'est point d'ailleurs un seul des anthropologistes anglais s'étant occupés de l'Inde qui ait eu sur ce peuple des renseignements anatomiques authentiques. Aussi est-ce avec intérêt que j'ai étudié, ces jours derniers, un petit lot de crânes de Dublas, rassemblés au cours d'une mission dans le Nord-Ouest de l'Inde par M^{lle} D. Ménant et offerts par elle à notre laboratoire du Muséum. Malheureusement, des quatre têtes osseuses recueillies dans un village de la côte, voisin de Bulsar et qui porte sur les cartes anglaises le nom de *Camp Tithal*, deux ont appartenu à des sujets (Jamni Rupli, Baisi Shakroo) trop jeunes pour se prêter à des mensurations utiles, et une troisième (cat. n° 17291) vient d'une fille, Soma Nathaendra, n'ayant point encore atteint son complet développement⁽³⁾, de sorte

(1) Il y avait, en outre, 11,848 Dhoudias et 5,253 Naïkas et autres, ce qui portait l'appoint des races noires dans ce district à 24,887 individus. La population totale étant de 78,207 (*Gazetteer of the Bombay Presidency, Surat*, vol. II, p. 194), les Kaliparaj entrent donc dans la masse environ pour 32 p. 100.

(2) *Op. cit.*, THANA, 1 part., p. 158.

(3) Voici cependant quelques mesures auxquelles s'est prêtée cette jeune tête : capacité crânienne : 1,200 centimètres cubes; circonférence horizontale : 465 mil-

qu'un seul de ces Dublas, Kauji Ika (cat. n° 17290), se prête à une description utile.

C'est un sujet masculin, ayant dépassé l'âge adulte. Les os sont minces, quoique d'une structure plutôt un peu grossière; la suture sagittale seule est effacée vers son milieu.

Toutes les dimensions sont réduites. Les diamètres égalent respectivement : l'antéro-postérieur, 177 millimètres, le transverse, 134, et le basilo-bregmatique 128. Les circonférences mesurent : l'antéro-postérieure et l'horizontale, chacune 490 millimètres; la transverse, 435. La capacité ne dépasse pas 1,385 centimètres cubes.

Les courbes sont régulières, mais la base du front forme un relief en V qui s'étale largement, et tout l'espace interorbitaire est renflé en un volumineux sinus dont une fracture de la voûte orbitaire permet de constater l'étendue. Ce front est d'ailleurs étroit (diamètre frontal minimum : 87; maximum : 110); les bosses frontales sont peu écartées, toutefois assez distinctes; les lignes temporales, fortement accentuées en avant, se suivent sur les temporaux par un brusque ressaut au passage de la suture. Les bosses pariétales sont bien détachées; l'occiput, un peu asymétrique, offre des lignes d'insertion assez nettes; enfin la base se montre relativement renflée et les détails y apparaissent avec une certaine rudesse.

Si l'on passe à l'analyse des caractères faciaux, on est d'abord et surtout frappé des dimensions exceptionnelles du squelette nasal; l'orifice, quadrilatère, est largement dilaté et atteint 31 millimètres; la hauteur restant moyenne (51), l'indice nasal monte à 60,7. Les os propres du nez sont également très étalés (15, 13 et 21 millimètres), quoique d'élévation ordinaire (20 et 24 millimètres); l'espace interorbitaire dépasse 26 millim. 5. Les orbites, de largeur médiocre (38 millimètres), mais relativement hauts (34 millimètres), donnent l'indice de 89,4.

Les dimensions de la face sont médiocres (diamètre bizygomatique, 133 millimètres; hauteur ophryo-alvéolaire, 88) et l'indice qui se tire de la comparaison des diamètres s'écarte à peine de la moyenne française de Broca (66,1).

Il résulte, en somme, de ce rapide examen de la seule tête osseuse connue de Dubla que le crâne est réduit dans toutes ses dimensions, surtout en largeur, et occupe, par suite, la limite inférieure de la dolichocéphalie; que sa loge frontale est surtout notablement rétrécie; enfin que, si la face

limètres; diamètre antéro-postérieur : 167; diamètre transverse maximum : 128; diamètre basilo-bregmatique : 121; indice céphalique : 76,6; 71,0; 93,1; diamètre frontal maximum : 103 millimètres; minimum : 91; bi-orbitaire externe : 98; bizygomatique : 117; hauteur de la face : 58; nez, longueur : 38, largeur : 20; orbite, hauteur : 28, largeur : 33; indice facial : 49,5; nasal : 52,6; orbitaire : 84,8.

a des dimensions ordinaires, des orbites plutôt étroits s'y associent à un squelette nasal remarquablement dilaté.

Plusieurs de ces traits ont déjà été signalés chez des noirs de l'Inde. Les Parias d'Alipore mesurés par Broca, les Maravars décrits par Callamand⁽¹⁾ se rapprochent de notre Dubla par leurs dimensions restreintes et une partie de leurs indices, mais ils sont hypsisténocéphales; leur face est réduite surtout en largeur et l'indice nasal a sensiblement diminué.

On se rendra compte de l'importance de ces variations en comparant les chiffres que j'ai groupés dans le petit tableau qui suit:

	DUBLA DE BULSAR.	MARAVARS.	PARIAS (Alipoor).	
	(1)	(21)	(12)	
Capacité crânienne.....	1,385 ^{cc}	1,281 ^{cc}	1,335 ^{cc}	
Circonférence horizontale.....	490 ^{mm}	488 ^{mm}	493 ^{mm}	
Diamètre {	antéro-postérieur maximum.....	177	175	176
	transverse maximum.....	134	131	131
	basilo-bregmatique..	128	132	133
	frontal maximum... ..	110	109	106
	frontal minimum... ..	87	93	91
	biorbitaire externe..	103	102	102
	bizygomatique.....	133	124	123
Hauteur de la face.....	88	84	84	
Nez.... {	longueur.....	51	47	46
	largeur.....	31	25	25
Orbite.. {	hauteur.....	34	32	31
	largeur.....	38	38	35
Indice... {	longueur-largeur... ..	75.7	74.5	74.4
	hauteur-longueur... ..	72.3	75.2	75.5
	hauteur-largeur... ..	95.5	100.9	101.5
	facial.....	66,1	67,4	68,2
	nasal.....	60,7	52,1	54,3
	orbitaire.....	89,4	83,8	89,2

(1) E. CALLAMAND, Les crânes des noirs de l'Inde (tribu des Maravars), *Rev. d'anthrop.*, 2^e série, t. I, p. 607-625, 1878.

CICHLIDÉS NOUVEAUX DE L'AMÉRIQUE CENTRALE,

PAR MM. LÉON VAILLANT ET JACQUES PELLEGRIN.

Les espèces nouvelles ici indiquées font partie des collections rassemblées par M. F. Bocourt lors du voyage que ce zélé naturaliste a effectué, de 1864 à 1867, au Guatemala. Elles seront décrites plus en détail